中・後期剤選択フローチャート

問題となっている雑草は何でしょうか？

ノビエ

広葉雑草

ホタルイ　コナギ　ヒレタゴボウ　オモダカ　クログワイ

ノビエ

落水が可能な状態ですか？

- できる → **散布は液剤か粒剤、どちらですか？**
  - 液剤（落水散布） → **クリンチャーＥＷ**
  - 粒剤（湛水散布） → **クリンチャー１キロ粒剤・ジャンボ**
- できない → **テッケンジャンボ**

ノビエ＋広葉雑草

散布は液剤か粒剤、どちらですか？

- 粒剤（湛水散布） → **ホタルイ、コナギが多いですか？クログワイ、オモダカが多いですか？**
  - クログワイ オモダカ が多い → **テッケンジャンボ**
  - 両方が多い → **ツイゲキ１キロ粒剤 ツイゲキ豆つぶ250**
- 液剤 → **ホタルイ、クログワイが発生していますか？**
  - 発生していない → **ロイヤント乳剤**
  - 発生している（落水散布） → **クリンチャーバスＭＥ液剤**
- できない → **ホタルイ、コナギが多いですか？クログワイ、オモダカが多いですか？**

広葉雑草

落水が可能な状態ですか？

- できる → **散布は液剤か粒剤、どちらですか？**
  - 液剤（落水散布） → **バサグラン液剤**
  - 粒剤（落水散布） → **バサグラン粒剤**
- できない → **散布は液剤か粒剤、どちらですか？**

効果が見込める雑草の限界葉齢

クリンチャーＥＷ	クリンチャー１キロ粒剤・ジャンボ	テッケンジャンボ	ツイゲキ１キロ粒剤 ツイゲキ豆つぶ250	ロイヤント乳剤	クリンチャーバスＭＥ液剤	バサグラン液剤	バサグラン粒剤
・ノビエ６葉期	・ノビエ５葉期（1.5kg散布／10a）	・ノビエ４葉期 ・ホタルイ４葉期 ・オモダカ 草丈30cm以下 ・クログワイ 草丈20cm以下	・ノビエ４葉期 ・ホタルイ 草丈20cm以下 ・オモダカ 矢尻葉４葉期まで ・クログワイ 草丈30cm以下 ・ヒレタゴボウ 草丈10cm以下	・ノビエ５葉期 ・コナギ 心形葉５葉期 ・オモダカ 矢じり葉３葉期 ・ヒレタゴボウ 草丈60cm以下	・ノビエ５葉期 ・ホタルイ 発生盛期～増殖中期まで ・オモダカ 草丈15cm以下 ・クログワイ 草丈20cm以下 ・ヒレタゴボウ 草丈30cm以下	・ホタルイ 発生盛期～増殖中期まで ・オモダカ 発生盛期～増殖初期まで ・クログワイ 草丈30cm以下 ・ヒレタゴボウ 草丈30cm以下	・ホタルイ 発生盛期～増殖中期まで ・オモダカ 発生盛期～発生揃期まで ・クログワイ 草丈15cm以下 ・ヒレタゴボウ 草丈30cm以下

※ヒレタゴボウに関しては、花芽がついた個体や茎が木化した個体には、効果が劣る場合があります。