

ウンカ類の調査結果

【9月15日調査】

市町村名	区域名	JA支店名	品種名	調査日	成虫（頭）			幼虫合計 （頭）	識別困難 （頭）	備考	
					トビイロウンカ	セジロウンカ	ヒメトビウンカ			生育ステージ	箱剤
大垣市	大垣	多芸島	ハツシモ	9月14日	0	2	0	6		糊熟期	ツインターボフェルテラ
大垣市	大垣	和合	ハツシモ	9月14日	0	3	1	11		乳熟期	ツインターボフェルテラ
大垣市	墨俣	名森	ハツシモ	9月16日	0	0	4	10		乳熟期	ツインターボフェルテラ
海津市	海津	海津北	ハツシモ	9月16日	0	0	20	8		糊熟期	ツインターボフェルテラ
海津市	海津	下多度	ハツシモ	9月16日	0	0	8	10		乳熟期	ツインターボフェルテラ
養老町	養老	池辺	北陸193号	9月15日	0	2	1	24		糊熟期	エバーコルワイト
養老町	養老	養老中	みなちから	9月15日	0	21	8	129		糊熟期	ブーンセクテラ
養老町	養老	上多度	ハツシモ	9月15日	0	16	12	37		糊熟期	ルーチンエキスパート
神戸町	神戸	神戸	ハツシモ	9月16日	0	39	64	178		乳熟期	ツインターボフェルテラ
神戸町	神戸	神戸	ハツシモ	9月16日	0	2	15	25		乳熟期	ブーンセクテラ
神戸町	神戸	神戸	ハツシモ	9月16日	0	16	48	149		乳熟期	ブーンアレス
輪之内町	安八	輪之内	ハツシモ	9月16日	0	0	3	7		糊熟期	ツインターボフェルテラ
安八町	安八	名森	ハツシモ	9月16日	0	1	11	42		乳熟期	スタウトダントツ
安八町	安八	名森	ハツシモ	9月16日	0	0	9	12		乳熟期	ブーンセクテラ
安八町	安八	名森	ハツシモ	9月16日	0	8	40	58		乳熟期	ブーンアレス
垂井町	不破	合原	ハツシモ	9月15日	0	9	0	18		乳熟期	ツインターボフェルテラ
合計					0	119	244	724	0		

※調査方法：払い落とし25株×2反復

各ウンカの主な被害

トビイロウンカ…秋ウンカと呼ばれ、稲の株元を集団で吸汁し、生息密度が高くなると「坪枯れ」を発生させます。

セジロウンカ…夏ウンカと呼ばれ、稲の水分や養分を吸汁するため、飛来が多い年には、出穂期前の稲の生育が悪くなり圃場全体が黄化します。

ヒメトビウンカ…吸汁による直接害よりも、イネ縞葉枯病の媒介による被害が大きくなります。

現在栽培されている「ハツシモ岐阜SL」は縞葉枯病に強い品種へ改良されています。