

ウンカ類の調査結果

【9月1日調査】

市町村名	区域名	JA支店名	品種名	調査日	成虫(頭)			幼虫合計(頭)	識別困難(頭)	備考	
					トビイロウンカ	セジロウンカ	ヒメトビウンカ			生育ステージ	箱剤
大垣市	大垣	多芸島	あさひの夢	8月30日	0	32	3	33		乳熟期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
大垣市	大垣	青墓	ほしじるし	8月30日	0	0	1	15		糊熟期	ルーチンブライト
大垣市	大垣	多芸島	ハツシモ	8月30日	0	8	2	36		出穂期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
大垣市	大垣	和合	ハツシモ	8月30日	0	47	5	92		幼穂形成期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
大垣市	墨俣	名森	ハツシモ	8月31日	0	5	2	55		出穂期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
海津市	海津	下多度	ほしじるし	8月30日	0	0	3	156		糊熟期	ルーチンブライト
海津市	海津	海津北	ハツシモ	8月30日	0	4	17	85		乳熟期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
海津市	海津	下多度	ハツシモ	8月30日	0	0	3	57		出穂期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
海津市	海津	海津中	しきゆたか1号	8月30日	0	0	5	21		乳熟期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
養老町	養老	池辺	北陸193号	8月31日	0	2	2	25		出穂期	エバ <sup>®</sup> -ゴ <sup>®</sup> ルワイト <sup>®</sup>
養老町	養老	養老中	みなちから	8月31日	0	110	28	190		出穂期	ブーンセ <sup>®</sup> クテラ
養老町	養老	上多度	ハツシモ	8月31日	0	7	7	19		出穂期	ルーチンエキスパート
養老町	養老	養老中	ほしじるし	8月31日	0	16	11	208		糊熟期	ルーチンブライト
神戸町	神戸	神戸	ほしじるし	8月31日	0	4	23	647		糊熟期	ルーチンブライト
神戸町	神戸	神戸	ハツシモ	8月31日	0	200	36	768		出穂期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
神戸町	神戸	神戸	ハツシモ	8月31日	0	5	11	55		出穂期	ブーンセ <sup>®</sup> クテラ
神戸町	神戸	神戸	ハツシモ	8月31日	0	21	18	195		出穂期	ブーンアレス
輪之内町	安八	輪之内	早植ハツシモ	8月31日	0	0	1	33		乳熟期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
輪之内町	安八	輪之内	ほしじるし	8月31日	0	1	6	286		糊熟期	ルーチンブライト
輪之内町	安八	輪之内	ハツシモ	8月31日	0	2	5	54		出穂期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ
安八町	安八	名森	ほしじるし	8月31日	0	0	3	63		糊熟期	ルーチンブライト
安八町	安八	名森	ハツシモ	8月31日	0	2	4	22		穂ばらみ期	スタウトダントツ
安八町	安八	名森	ハツシモ	8月31日	0	2	1	8		穂ばらみ期	ブーンセ <sup>®</sup> クテラ
安八町	安八	名森	ハツシモ	8月31日	0	3	3	37		穂ばらみ期	ブーンアレス
垂井町	不破	府中	ほしじるし	8月30日	0	1	6	81		乳熟期	ルーチンブライト
垂井町	不破	合原	ハツシモ	8月30日	0	16	0	32		出穂期	ツインターボ <sup>®</sup> フェルテラ

※調査方法：払い落とし25株×2反復

各ウンカの主な被害

トビイロウンカ…秋ウンカと呼ばれ、稲の株元を集団で吸汁し、生息密度が高くなると「坪枯れ」を発生させます。

セジロウンカ…夏ウンカと呼ばれ、稲の水分や養分を吸汁するため、飛来が多い年には、出穂期前の稲の生育が悪くなり圃場全体が黄化します。

ヒメトビウンカ…吸汁による直接害よりも、イネ縞葉枯病の媒介による被害が大きくなります。現在栽培されている「ハツシモ岐阜SL」は縞葉枯病に強い品種へ改良されています。